

CALENDARIO DE INMUNIZACIÓN

PARA TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA

RECOMENDADO POR LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2023



CALENDARIO DE INMUNIZACIÓN PARA TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA

RECOMENDADO POR LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2023



VACUNA

	GESTANTE	EDAD EN MESES						EDAD EN AÑOS								
		2	3	4	11	12	15	3/4	5/6	12	14	15/18	40	50	≥ 65	
Difteria, Tétanos y Tosferina ¹	dTpa	DTPa		DTPa	DTPa				DTPa + VPI		dTpa		dTpa		dTpa	
Poliomielitis ¹		VPI		VPI	VPI											
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b ¹		Hib		Hib	Hib											
Hepatitis B ²		HB		HB	HB											
Neumococo ³		VNC		VNC	VNC										VNC	
Meningococo B ⁴		MenB		MenB		MenB										
Meningococo ACWY ⁵				Men ACWY		Men ACWY				Men ACWY						
Sarampión, Rubeola y Parotiditis ⁶						TV		TV + Var								
Varicela ⁷							Var									
Rotavirus ⁸		RV	RV	(RV)												
Virus del Papiloma Humano ⁹										VPH						
Herpes Zóster ¹⁰															HZ	
Gripe ¹¹	GR				GR (De 6 a 59 meses)*											GR
Hepatitis A ¹²						VHA										
VRS ¹³	VRS	Ac Monoclonal														VRS
SARS-CoV-2 ¹⁴	COVID				6-59 meses**				5-60 años ***						COVID	



- 1** Esquema 2+1 con vacunas hexavalentes a los 2, 4 y 11 meses, DTPa-VPI a los 6 años y dTpa a los 14 años, a los 40 años (excepto en mujeres que la hubieran recibido con anterioridad por gestación previa) y a partir de los 65 años.
- 2** Lactantes: 3 dosis en forma de vacuna hexavalente, con pauta 2, 4 y 11 meses de edad. Escolares y adolescentes no vacunados: 3 dosis de vacuna monocomponente, con pauta 0, 1 y 6 meses.
- 3** Lactantes: 2+1 (2, 4 y 11 meses). Todos los menores de 5 años, así como a todos los niños y adolescentes de cualquier edad con enfermedades de riesgo con vacuna trideivalente. Para conseguir una óptima protección en mayores de 65 años, se recomienda usar la vacuna neumocócica conjugada que cubra el mayor número de serotipos posibles, adaptada a la epidemiología local.
- 4** Lactantes: a partir de los 2 meses de edad, con una pauta 2+1.
- 5** Lactantes: 4 meses y 12 meses (condicionado a los resultados de los ensayos clínicos en desarrollo). Adolescentes: 12 años, con un rescate progresivo hasta los 18 años. Mayores de 6 semanas de vida con factores de riesgo de enfermedad meningocócica invasora (EMI) o que viajen a países de elevada incidencia.
- 6** Dos dosis de Triple Vírica (sarampión, parotiditis y rubeola): 1ª dosis a los 12 meses de vida y 2ª a los 3-4 años de edad. La segunda dosis puede administrarse en forma de tetravírica (SRPV).
- 7** Dos dosis de Varicela: 15 meses y 3-4 años de edad. La segunda dosis, puede administrarse en forma de vacuna combinada tetravírica.
- 8** Lactantes: 2 o 3 dosis en función del preparado vacunal.
- 9** Virus del Papiloma Humano independientemente del género, preferentemente a los 11-12 años.
- 10** Dos dosis de vacuna de subunidades con pauta 0-2 meses.
- 11** Todos los niños de entre 6 y 59 meses * Gripe Intranasal de 24 a 59 meses. Todos los niños mayores de 6 meses incluidos en los grupos de riesgo. Todos los adultos a partir de los 65 años.
- 12** Una dosis pediátrica entre los 12 y 15 meses.
- 13** Vacuna VRS para embarazadas y para mayores de 65 años. Anticuerpo monoclonal (niservimab) hasta los 6 meses en temporada.
- 14** ** SARS-CoV-2 en niños de 6 a 59 meses vacunación con refuerzos adicionales si riesgo de COVID grave.
*** SARS-CoV-2 de 5 a 60 años primovacunación + 1 refuerzo. Refuerzos adicionales sólo si obesidad severa, comorbilidades, inmunosupresión o sanitarios.